

*O. Л. Ловелиус*

*O. Lovelius*

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ГОРАХ ПУТОРАНА  
(ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)

NOVITATES PRO FLORA MONTIUM PUTORANA (SIBIRIA  
ORIENTALIS)

Горы Путорана, расположенные в Енисейском районе Восточной Сибири, являются одним из труднодоступных и малоизученных ботаниками районов.

При обработке коллекций растений, собранной в этих горах в июле—августе 1967 г. и любезно предоставленной мне сотрудником палеогеографической экспедиции Педагогического института им. А. И. Герцена Ловелиусом Н. В., мною был обнаружен ряд редких для флоры Восточной Сибири видов. Сборы растений проводились по маршрутам: озера Аян и Мономакли, долины рек Ноку-Урек и Амнундакты, бассейн р. Нерал, вершины Камень, Котуйская и Халакит.

1. *Phippsia concinna* (Th. Fries) Lindeb.

Почти исключительно арктический вид. Описан со Шпицбергена. Встречается на Полярном Урале, в Гыданской тундре, на Новой Земле, по берегам Карского моря, на п-ове Таймыр, в устьях рр. Енисея, Хеты, Таймыры. Самое южное и наиболее близкое к нашему местонахождение этого вида: Эвенкийское плато, лесотундра у пос. Хантайского на Енисее, 68° (сборы В. Ревердатто). Вне Арктики встречается редко. В горах Путорана найден впервые.

Горы Путорана, собран на горе Халакит, выс. 900 м над ур. м. и на горе Камень, на переувлажненном склоне, выс. 900 м над ур. м., 7 VIII 1967.

2. *Carex williamsii* Britt.

Редкий арктический вид с разорванным ареалом. Растет на сфагновых болотах в тундрах и на гольцах. В СССР встречается на Полярном Урале, на побережье Обской губы (Ныда), в Центральном Саяне, в низовьях Лены, на Верхоянском хребте, в южном Забайкалье (басс. р. Чикоя), в истоках р. Буреи, в верховьях

Колымы (басс. р. Талой), в бассейнах рр. Анадыря и Пенжины, на Камчатке и Чукотском п-ове. Для северной части Красноярского края не приводился. В горах Пutorана найден впервые.

Горы Пutorана, водораздел р. Нерал и оз. Мономакли, 14 VIII 1967.

3. *Calamagrostis holmii* Lange.

Почти исключительно азиатский арктический вид, описанный с Новой Земли. Встречается в Большеземельской и Гыданской тундре, на п-ове Таймыр, по берегам Енисейского залива и в низовьях Енисея (на юг до 69° с. ш.), в низовьях Оленька и Ана-бара, в низовьях Лены (до ее устья) и дальше к востоку вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана до Чукотского п-ова, включая Новосибирские острова и о. Врангеля. Вне Арктики встречается в северной части Средне-Сибирского плато, на Верхоянском хребте (на юг до басс. р. Томпо) и районах Якутии к востоку от него. Для флоры Красноярского края этот вид не приводился. Ближайшее местонахождение — сел. Гольчиха в низовьях Енисея. В горах Пutorана найден впервые.

Горы Пutorана, устье р. Ноку-Урек, 18 VIII 1967.

4. *Saxifraga tenuis* (Wahl.) H. Sw.

Арктический вид. Описан из Скандинавии. В СССР встречается на Новой Земле, на Таймырском п-ове, в устье р. Енисей, в низовьях р. Пясины. Южнее Таймырского п-ова не собирался. Для гор Пutorана это очень интересная находка.

Горы Пutorана, в 7 км к югу от горы Камень, выс. 950 м над ур. м., 12 VIII 1967.

5. *Polemonium pulchellum* Bunge.

Редкое растение, описанное с Алтая. Встречается в Восточном Саяне (Удинский и Окинский хребты), а также в северо-западной части Саяна и на хр. Хамар-Дабан. Для северной части Красноярского края этот вид не приводился.

Горы Пutorана, пойма р. Ампундакты, в 3 км к северу от оз. Аян, 28 VII 1967.

6. *Saussurea pseudoangustifolia* Lipsch.

Редкий вид, описанный из окрестностей Аяна (Дальний Восток). Позднее был найден еще в Якутии на хр. Джугджур (правый берег р. Чукакган). На территории Красноярского края найден впервые.

Горы Пutorана, верховье р. Нерал, выс. 700 м над ур. м., 14 VIII 1967.

*7. Pachypleurum schischkinii* (Serg.) Malysch.

Встречается в горных районах Восточного и Центрального Саяна. Найден также в юго-восточном Алтае и в горах северного Прибайкалья. Кроме того, в Гербарии Ботанического института АН СССР имеется несколько экземпляров этого вида с Таймырского п-ова (с рек Хатанги и Дудынты) и с пизовьев Енисея (близ пос. Гольчиха), собранных А. И. Толмачевым (1926 г.) и Виноградовой (1934 г.). В горах Пutorана найден впервые.

Горы Пutorана, высокая пойма в устье р. Ноку-Урек, 16 VIII 1967.

Кроме перечисленных выше видов, приводим список некоторых видов, сборы которых из данного района отсутствуют в Гербарии Ботанического института АН СССР: *Dryopteris fragrans* (L.) Schott, *Alopecurus alpinus* Sm., *Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb., *Festuca ovina* L., *Roegneria borealis* (Turcz.) Nevski, *Carex procerula* V. Krecz., *C. stans* Drec., *C. resicata* Meinh., *Oxyria digyna* (L.) Hill, *Claytonia joanneana* Roem., *Arctous alpina* (L.) Nied., *Dianthus versicolor* Fisch., *D. repens* Willd., *Minuartia arctica* (Stev.) Aschers. et Graebn., *Stellaria edwardsii* R. Br., *Silene paucifolia* Ledeb., *Papaver lapponicum* (Tolm.) Nordh., *Draba micropetala* Hook., *Cardamine bellidifolia* L., *Parnassia multisetosa* Fern., *Saxifraga bronchialis* L., *S. rivularis* L., *S. serpyllifolia* Pursh, *Hedysarum arcticum* B. Fedtsch., *H. alpinum* L., *Pedicularis sudetica* Willd., *Campanula langsdorffiana* Fisch., *Arnica iljinii* (Maguire) Iljin, *Erigeron elongatus* Ledeb., *Senecio resedifolius* Less.